7. 식물의 수송



수분퍼텐셜 = 용질 P + 압력 P
(-CRT)

8. 식물의 호르몬.

① 옥신 ex) IAA Trp유래.



극성수송
중력무관.

세포생장.



청색광
↓
포토트로핀 (Ser/Thr K)
↓
옥신의 측면수송
↓
빌딩블록 세포막 H+pump.
↓
세포벽 pH↓. expansin
↓
세포벽의 수소결합 끊김.
↓
H2O in.
↓
빌딩블록 세포신장.

생성 생장실

지하경 음성굴지성	뿌리 양성굴지성
↓ →	→

단위결실.
결눈상동현상
잎의 탈리현상.

② 지베렐린.
- 세포분열. 세포신장
- 종자발아
- 노화의 단위결실.

습윤 → GA out from 배아
→ 배젖의 호분층. α-아밀레이스 ↑
→ 녹말을 분해하여 포도 ↑.

③ 앱시신산.
- 종자휴면
- 기공 닫음



수분스트레스 → ABA ↑ → 이온out. H2Oout. → 기공닫힘.

(기공열림) 청색광 → 제아크산틴 → H+ pump → 세포내부 ⊖ → K+ in. H2O in → 기공열림.



증산량↑. CO2↓. 잎주기리듬

④ 에틸렌. Met 유래. 기체 H.
- 노화촉진. (낙엽. 과일성숙) ⊕피드백.
- 굽힘반응 → 줄기생장↓. 측면비대생장. 옆눈 굴절유상실.

⑤ 시토키닌. ex) 제아틴. 카더틴. ← 아데닌 (아미노퓨린) 유래.
- 세포분열↑. 세포분화.
- 곁눈생장↑

9. 식물 방어

① 병원체
- 구성적 — 큐틴. 슈베린 etc.
- 유도성
  - PAMP — PRR (세포막)
  - 식물R (effector) — R (세포질) → 활성산소. NO生. 원형질연락사차단 피토알렉신 生 병원체산란 PR-1(PR)生
  - 과민반응(HR) 유도.

살리실산.
↑
SAR (전신 획득 저항)



식물 / 세균	R1.2	R3.4	R1.4
Avr 1.2			
Avr 2.3			
Avr 1.4			

② 초식동물
- 구성적 — 가시. 털. 2'-데시옥질.
- 유도성 — 상처입은부위 시스테민out. → 시스테민-R → 리놀렌산 (세포막) → 자스몬산.

연애질분해효소 억제제 → 초식동물 소화↓.
이웃식물방어↑. 환경유인.

10. 식물의 개화조절.

(광수용체) 청색광(R)
- 포토트로핀. — ⊕굴광성, 기공열림.
- 제아크산틴 — 기공열림. 열소산.
- 크립토크롬.

엽록소. 청색(400nm) 적색(600nm)
피토크롬. 적색(660nm) 근적외광(730)



- 혼광성 종자 발아

	발아
R	o
R-FR	x
R-FR-R	o

- 유식물 발아 Pr → Pfr
  - 청백화 - 엽록. 플라스틱↓
  - 녹화 - 엽록生. 줄기신장↓. 잎 확장.
- 암지식물의 음지환경반응
- 안위경일 개화.